



## Аллергология и иммунология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 02:27 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 02:27 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

АЛЛЕРГЕНЫ ИЗ ПЕРХОТИ ЛОШАДИ ИМЕЮТ ПЕРЕКРЁСТНЫЕ АЛЛЕРГЕННЫЕ СВОЙСТВА С СЫВОРОТКОЙ

1. противодифтерийной
2. противогангренозной
3. противоботулинической
4. противостолбнячной

**Правильный ответ: 4 — противостолбнячной**

## Вопрос 2

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ВИСКОТТА - ОЛДРИЧА ЯВЛЯЕТСЯ

1. сочетание триметоприма-сульфаметоксазола с фторхинолонами и противогрибковыми препаратами
2. назначение преднизолона в дозе 2 мг/кг массы тела
3. трансплантация костного мозга от HLA-идентичного донора
4. применение аттенуированных антител

**Правильный ответ: 3 — трансплантация костного мозга от HLA-идентичного донора**

## Вопрос 3

АСТМА У ПАЦИЕНТОВ, УЖЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ, КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ЛЕГКАЯ, ЕСЛИ ХОРОШО КОНТРОЛИРУЕТСЯ

1. терапией 3-й ступени
2. терапией 1-й и 2-й ступеней
3. без базисной терапии
4. терапией 4-й и 5-й ступеней

**Правильный ответ: 2 — терапией 1-й и 2-й ступеней**

## Вопрос 4

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ЛЕКАРСТВА ВОЗНИКАЮТ ВСЛЕДСТВИЕ

1. введения больших доз препаратов с разной химической структурой
2. подкожного и внутривенного введения препаратов с подобной структурой
3. сенсибилизации к химическим веществам, имеющим схожую структуру
4. одновременного введения более двух препаратов с одинаковой химической структурой

**Правильный ответ: 3 — сенсибилизации к химическим веществам, имеющим схожую структуру**

## Вопрос 5

ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ, ПО ДАННЫМ СПИРОМЕТРИИ, СОСТОИТ В

1. ответной реакции на лечение ингаляционными глюкокортикостероидами

- 2. обратимости бронхиальной обструкции
- 3. выраженности бронхообструктивных нарушений
- 4. ответной реакции на лечение пролонгированными холинолитиками

**Правильный ответ: 2 — обратимости бронхиальной обструкции**

## Вопрос 6

К ФАКТОРАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ КОЖИ НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1. щелочная среда ( $\text{pH} > 7$ )
- 2. отшелушивание рогового слоя
- 3. наличие факторов неспецифической резистентности (лизоцим, пропердин и др.)
- 4. целостность рогового слоя

**Правильный ответ: 1 — щелочная среда ( $\text{pH} > 7$ )**

## Вопрос 7

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ Х-СЦЕПЛЕННОЙ АГАММАГЛОБУЛИНЕМИИ, ОТНОСЯТ

- 1. склонность к вирусным инфекциям, частое развитие пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii*
- 2. склонность к рецидивирующим отекам
- 3. начало рецидивирующих бактериальных инфекций в первые 2 года жизни у пациентов мужского пола
- 4. склонность к грибковым инфекциям, парвовирусиндуцированную апластическую анемию, склерозирующий холангит

**Правильный ответ: 3 — начало рецидивирующих бактериальных инфекций в первые 2 года жизни у пациентов мужского пола**

## Вопрос 8

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ МИШЕНЬЮ ДЕЙСТВИЯ БЕНРАЛИЗУМАБА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЦЕПТОР К

- 1. тимическому стромальному лимфопоэтину
- 2. интерлейкину-5
- 3. интерлейкину-13
- 4. интерлейкину-4

**Правильный ответ: 2 — интерлейкину-5**

## Вопрос 9

БОЛЬНЫЕ С АЛЛЕРГИЕЙ К АНАЛЬГИНУ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ТАКЖЕ

- 1. Сальбутамол
- 2. Теофедрин
- 3. Беротек
- 4. Теофиллин

**Правильный ответ: 2 — Теофедрин**

## Вопрос 10

НАИБОЛЬШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЫЛЬЦЫ БЕРЕЗЫ НАБЛЮДАЕТСЯ В

- 1. мае
- 2. сентябре
- 3. августе
- 4. июле

**Правильный ответ: 1 — мае**