



## Хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 07:13 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 06:55 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ МОГУТ БЫТЬ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

- 1. инвагинационной
- 2. спастической
- 3. спаечной
- 4. странгуляционной

**Правильный ответ: 1 — инвагинационной**

## Вопрос 2

ИНФИЦИРОВАННЫМИ НАЗЫВАЮТСЯ РАНЫ

- 1. после санации гнойного очага
- 2. обсеменённые микрофлорой, с признаками нагноения
- 3. гнойные с признаками инфекционно-воспалительного процесса
- 4. обсеменённые микрофлорой, но без признаков нагноения

**Правильный ответ: 3 — гнойные с признаками инфекционно-воспалительного процесса**

## Вопрос 3

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ У ВЗРОСЛОГО ПРИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОЖОГОВ \_\_\_ %

- 1. 15-20
- 2. 5
- 3. 25-30
- 4. 20-25

**Правильный ответ: 1 — 15-20**

## Вопрос 4

К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ АХАЛАЗИИ КАРДИИ ОТНОСИТСЯ

- 1. дисфагия
- 2. боль в пояснице
- 3. диарея
- 4. боль в эпигастрии

**Правильный ответ: 1 — дисфагия**

## Вопрос 5

КРОВОХАРКАНИЕ НАИБОЛЕЕ РЕДКО ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1. пневмосклерозе
- 2. синдроме Рандю-Ослера
- 3. распаде рака главного бронха
- 4. бронхолитиазисе

**Правильный ответ: 1 — пневмосклерозе**

## Вопрос 6

для лечения стойкого и длительного кардиоспазма применяют

1. оперативный метод
2. медикаментозный метод
3. кардиодилатацию
4. эндопротезирование пищевода

**Правильный ответ: 3 — кардиодилатацию**

## Вопрос 7

для наилучшего результата эмпирическая антибактериальная терапия рекомендована \_\_\_ с момента диагностики сепсиса у ожоговых больных

1. после получения результатов микробиологического исследования
2. в течение 1 часа
3. в течение суток
4. после консультации клинического фармаколога

**Правильный ответ: 2 — в течение 1 часа**

## Вопрос 8

согласно классификации в РФ различают \_\_\_ степени отморожений

1. I, II, III A, III B, IV
2. I, II, III
3. I, II, III, IV
4. I, II A, II B, III

**Правильный ответ: 3 — I, II, III, IV**

## Вопрос 9

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, является

1. реабилитационной
2. плановой
3. неотложной
4. экстренной

**Правильный ответ: 3 — неотложной**

## Вопрос 10

инфузионную терапию при свежей термической травме у пострадавшего средней возрастной группы необходимо проводить при минимальном индексе Франка

1. 10-15
2. 10-20

3 20-25

4. 30-40

**Правильный ответ: 3 — 20-25**