MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Клиническая фармакология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:38 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ПРЕПАРАТОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ГИПОТЕНЗИВНЫЙ И АНТИАНГИНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. метамизол натрия
2. триметазидин
3. **бисопролол**
4. гепарин натрия

Правильный ответ: 3 - бисопролол

Вопрос 2

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИЁМЕ ПРЕПАРАТА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНГИБИТОРОМ СИСТЕМЫ ЦИТОХРОМА Р450, ВОЗМОЖНО

1. уменьшение риска развития побочных эффектов
2. **замедление метаболизма лекарственных средств**
3. снижение эффективности лекарственных средств
4. ускорение метаболизма лекарственных средств

Правильный ответ: 2 - замедление метаболизма лекарственных средств

Вопрос 3

ПРИМЕНЕНИЕ ИАПФ В СОЧЕТАНИИ СО СПИРОНОЛАКТОНОМ В ДОЗЕ БОЛЕЕ 25 МГ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1. гиперкальциемии
2. **гиперкалиемии**
3. гипернатриемии
4. гипермагниемии

Правильный ответ: 2 - гиперкалиемии

Вопрос 4

РАНДОМИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1. модель выявления, изучения, оценки и профилактики неблагоприятных побочных реакций
2. ведение наблюдения за группой пациентов, использующих определённый вид лечения, до развития интересующего исхода; частота исхода сравнивается с таковым в контрольной группе
3. **процесс распределения пациентов между исследуемыми группами, использующий элементы случайности, позволяющий добиться эквивалентности групп между собой и максимально уменьшить необъективность при получении данных**
4. исследование, в котором ни врач, ни пациент, ни организаторы исследования не знают назначенной терапии у каждого конкретного пациента

Правильный ответ: 3 - процесс распределения пациентов между исследуемыми группами, использующий элементы случайности, позволяющий добиться эквивалентности групп между собой и максимально уменьшить необъективность при получении данных

Вопрос 5

ГИПОТЕНЗИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБНЫМ УВЕЛИЧИВАТЬ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. телмисартан
2. **нифедипин**
3. сакубитрил
4. фозиноприл

Правильный ответ: 2 - нифедипин

Вопрос 6

ПАЦИЕНТУ, ИМЕЮЩЕМУ В АНАМНЕЗЕ ЯЗВЕННУЮ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

1. индометацин
2. **мелоксикам**
3. кеторолак
4. кетопрофен

Правильный ответ: 2 - мелоксикам

Вопрос 7

ВСАСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИХСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА (НАПРИМЕР, ДИГОКСИНА), ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ С АНТИБИОТИКАМИ

1. зависит от принимаемой пищи
2. зависит от состояния слизистой кишечника
3. угнетается
4. **усиливается**

Правильный ответ: 4 - усиливается

Вопрос 8

АНТАЦИДЫ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ _____ ЕДЫ

1. строго за 40 минут до
2. строго во время
3. **после**
4. за час до

Правильный ответ: 3 - после

Вопрос 9

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ 3-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛГЛУТАРИЛ КОЭНЗИМА А-РЕДУКТАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **рабдомиолиз**
2. повышение уровня печеночных ферментов
3. миопатия
4. повышение уровня креатинфосфокиназы;

Правильный ответ: 1 - рабдомиолиз

Вопрос 10

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕВЫХ СЛАБИТЕЛЬНЫХ У БЕРЕМЕННЫХ МОЖЕТ ПРОВОЦИРОВАТЬ

1. повышение артериального давления
2. изжогу
3. формирование отёчного синдрома
4. **рефлекторную стимуляцию матки**

Правильный ответ: 4 - рефлекторную стимуляцию матки