MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Нефрология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 09:01 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

СИМПТОМЫ ИНТОКСИКАЦИИ, БОЛИ В ЖИВОТЕ И ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НАБЛЮДАЮТ ПРИ

1. вульвовагините
2. цистите
3. дисметаболической нефропатии
4. **пиелонефрите**

Правильный ответ: 4 - пиелонефрите

Вопрос 2

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗА ГОВОРИТ ДОЛЯ ГИПОХРОМНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. 20
2. 25
3. 15
4. **10**

Правильный ответ: 4 - 10

Вопрос 3

У ПАЦИЕНТА С ОСТРОЙ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ ОДНИМ ИЗ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1. антитела к гистонам
2. **анти-Sm антитела**
3. анти-scl-70 антитела
4. анти-Ro антитела

Правильный ответ: 2 - анти-Sm антитела

Вопрос 4

ИНИЦИАЛЬНАЯ ГЕМАТУРИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

1. нефрите
2. простатите
3. **уретрите**
4. цистите

Правильный ответ: 3 - уретрите

Вопрос 5

НАРУШЕНИЕ СОСТАВА КОЛЛАГЕНА БАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАН ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ

1. остром пиелонефрите
2. липоидном нефрозе
3. подагрической почке
4. **синдроме Альпорта**

Правильный ответ: 4 - синдроме Альпорта

Вопрос 6

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК РАЗВИТИЕ АНЕМИИ ОБУСЛОВЛЕНО

1. **снижением синтеза эритропоэтина почками**
2. снижением уровня ферритина
3. нарушением всасывания железа в кишечнике
4. снижением уровня трансферрина

Правильный ответ: 1 - снижением синтеза эритропоэтина почками

Вопрос 7

ПРИЧИНОЙ ПРЕРЕНАЛЬНОГО ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК ВЫСТУПАЕТ

1. острый интерстициальный нефрит
2. обтурация мочеточников
3. острый гломерулонефрит
4. **сердечная недостаточность**

Правильный ответ: 4 - сердечная недостаточность

Вопрос 8

УРАТАМИ НАЗЫВАЮТ СОЛИ _____ КИСЛОТЫ

1. щавелевой
2. фосфорной
3. янтарной
4. **мочевой**

Правильный ответ: 4 - мочевой

Вопрос 9

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ТЕРАПИЮ КОРТИКОСТЕРОИДАМ И АЗАТИОПРИНОМ, РЕКОМЕНДОВАНО

1. **продолжить прием препаратов в подобранной дозе, не снижать дозы этих препаратов в период беременности и продолжить лечение как минимум в течение 3 месяцев после родоразрешения**
2. отменить терапию кортикостероидами
3. отменить терапию азатиоприном
4. азатиоприн заменить на мофетил-микофеналат, проводить данную терапию в течение всей беременности и продолжить лечение в течение 1 месяца после родоразрешения

Правильный ответ: 1 - продолжить прием препаратов в подобранной дозе, не снижать дозы этих препаратов в период беременности и продолжить лечение как минимум в течение 3 месяцев после родоразрешения

Вопрос 10

КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА , ЯВЛЯЕТСЯ

1. комбинация с бета-адреноблокаторами
2. переливание свежезамороженной плазмы
3. **бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов**
4. комбинация с блокаторами кальциевых каналов и калийсберегающими диуретиками

Правильный ответ: 3 - бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов