MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ортодонтия

Высшее образование | DOCX · PDF | Задач: 1 | Вопросов: 12

Сформировано: 21.11.2026, 02:33 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Ситуационная задача 0002

12 вопросов · Ортодонтия · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

На консультацию к врачу-ортодонту пациентку 30 лет направила врач-стоматолог-терапевт.

1.2. Жалобы

на

- неправильное положение зубов.

1.3. Анамнез заболевания

Рождена в срок, вскармливание естественное, врожденные аномалии развития челюстно-лицевой области отсутствуют, ранее ортодонтическое лечение не проводилось.

1.4. Анамнез жизни

Перенесенные заболевания: аллергии отрицает.

1.5. Объективный статус

Внешний осмотр: лицо симметричное, положение подбородка кзади, профиль выпуклый, открывание рта свободное.



морозова2_01.11_рис1.jpg



морозова2_01.11_рис2.jpg

Осмотр полости рта: смыкание по дистальному типу, средняя межрезцовая линия верхнего и нижнего зубных рядов не совпадает, мезиальный сдвиг боковой группы зубов верхней челюсти и зубов 3.7; 3.8; 4.8. Ретрузия передней группы зубов верхней челюсти. Адентия 1.3; 3.6; 4.6; 4.7.

По данным ТРГ головы в боковой проекции:
SNA- 79, SNB- 72 , ANB-7 , NL/ML – 24, U1/NL- 85, L1/ML-95, U1-NA= - 3мм, L1-NB= 3мм.

По данным ОПТГ адентия 1.3; 3.6; 4.6; 4.7.

1. План обследования

Вопрос 1

Для определения ширины зубных рядов используется метод

1. Снагиной
2. **Пона**
3. Нанса
4. Долгополовой

Правильный ответ:
2 - Пона

ОБОСНОВАНИЕ

Для определения трансверсальных размеров зубных рядов используют методику Пона, которая основана на зависимости между суммой мезиодистальных размеров 4-х верхних резцов и расстоянием между первыми премолярами и первыми молярами на верхней и нижней челюстях.

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

3. Результаты инструментального метода обследования

3.1. Метод Пона

Сужение верхнего и нижнего зубных рядов.

3.3. Метод Долгополовой

Применяется во временной окклюзии.

Вопрос 2

Метод Коркхауза используется для определения

1. **длины переднего отрезка зубного ряда**
2. длины апикальных базисов
3. ширины зубного ряда
4. ширины апикальных базисов

Правильный ответ:
1 - длины переднего отрезка зубного ряда

ОБОСНОВАНИЕ

В период окклюзии постоянных зубов в сагиттальном направлении длину переднего отрезка верхнего и нижнего зубных рядов измеряют по методу Коркхауза.

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

Вопрос 3

Мезиальный сдвиг боковой группы зубов определяют по методу

1. **Фусса**
2. Тонна
3. Поповой
4. Нанса

Правильный ответ:
1 - Фусса

ОБОСНОВАНИЕ

зубном ряду в сагиттальном и трансверсальном направлениях используют методику Фусса (Fuss), которая позволяет сопоставить размеры правой и левой половин зубного ряда и определить односторонний мезиальный сдвиг боковой группы зубов на гипсовых моделях челюстей.

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

2. Диагноз

Вопрос 4

Предварительным диагнозом пациентки является Дистальная окклюзия,

1. глубокая резцовая дизокклюзия
2. вертикальная резцовая дизокклюзия
3. **трансверзальная резцовая окклюзия**
4. мезиальная окклюзия

Правильный ответ:
3 - трансверзальная резцовая окклюзия

ОБОСНОВАНИЕ

При несовпадении средней межрезцовой линии диагностируется транверсальная резцовая окклюзия.

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

7. Диагноз

7.1. Дистальная окклюзия, трансверзальная резцовая окклюзия

Вопрос 5

Увеличение параметра Go-Pg говорит о

1. микрогнатии нижней челюсти
2. **макрогнатии нижней челюсти**
3. макрогнатии верхней челюсти
4. микрогнатии верхней челюсти

Правильный ответ:
2 - макрогнатии нижней челюсти

ОБОСНОВАНИЕ

Увеличение на ТРГ головы параметров длины тела нижней челюсти свидетельствует о макрогнатии нижней челюсти.

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

Вопрос 6

Наклон резцов нижней челюсти определяется по параметрам

1. U1/NL
2. SNB
3. NSL/NL
4. **L1/ML**

Правильный ответ:
4 - L1/ML

ОБОСНОВАНИЕ

Наклон оси зуба определяется к плоскости основания соответствующей челюсти.

Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3227-3 (1)

Вопрос 7

К дополнительным методам диагностики, которые нужно провести пациентке с дистальной окклюзией, ретрузией резцов верхней челюсти, относят

1. ОПТГ
2. рентгенографию височно-нижнечелюстного сустава
3. **МРТ ВНЧС**
4. ТРГ в прямой проекции

Правильный ответ:
3 - МРТ ВНЧС

ОБОСНОВАНИЕ

Аномалиям зубочелюстной системы отводится важная роль в патогенезе заболеваний ВНЧС. МРТ является «золотым стандартом» для диагностики патологических изменений суставов вообще и ВНЧС в частности.

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

Вопрос 8

Межчелюстной угол определяется по параметру

1. **ML-NL**
2. NL/NSL
3. ML/NSL
4. ANS-PNS

Правильный ответ:
1 - ML-NL

ОБОСНОВАНИЕ

ML-NL - угол, характеризующий взаиморасположение оснований верхней и нижней челюстей (межчелюстной угол).

Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 (1)

3. Лечение

Вопрос 9

В данном клиническом случае проводится ортодонтическое лечение с использованием

1. **брекет-системы**
2. функционального аппарата
3. ортогнатической хирургией
4. съемного ортодонтического аппарата механического действия

Правильный ответ:
1 - брекет-системы

ОБОСНОВАНИЕ

В период окклюзии постоянных зубов показано использование несъемных ортодонтических конструкций (брекет-система).

Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3227-3 (1)

Вопрос 10

К смежным специалистам, которые могут оказать помощь ортодонту в построении плана лечения для данной пациентки, относят врача

1. остеопата
2. пародонтолога
3. стоматолога-терапевта
4. **стоматолога-ортопеда**

Правильный ответ:
4 - стоматолога-ортопеда

ОБОСНОВАНИЕ

Зубное протезирование включает восстановление анатомической формы разрушенных постоянных зубов с целью нормализации функций ЗЧС и предотвращения смещения соседних и противостоящих зубов в сторону дефектов.

Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3227-3 (1)

4. Вариатив

Вопрос 11

Ретенционным аппаратом, который необходимо назначить при такой клинической ситуации, является

1. ретейнер Бегга
2. несъемный ретейнер
3. **штампованная капа**
4. пластинка Хаулея

Правильный ответ:
3 - штампованная капа

ОБОСНОВАНИЕ

Съемные ретенционные аппараты эффективны для ретенции после коррекции деформации зубного ряда.

Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3227-3 (1)

Вопрос 12

Отсутствие ортодонтического лечения в данном возрасте приведет к

1. **дисфункции ВНЧС**
2. появлению клиновидных дефектов
3. только эстетическим проблемам
4. повышенной стираемости зубов

Правильный ответ:
1 - дисфункции ВНЧС

ОБОСНОВАНИЕ

Неправильный прикус предрасполагает к неравномерному распределению жевательного давления и как следствие повышенной нагрузке на ВНЧС.

Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3227-3 (1)