MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Педиатрия (ПП)

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:47 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПОДЛЕЖАТ ДЕТИ, ОБРАТИВШИЕСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ С ЖАЛОБАМИ НА

1. субфебрилитет в течение недели, потерю массы тела, жидкий стул
2. **кашель и лихорадку более 2-3 недель**
3. боль в грудной клетке, гипертермию в течение 7 дней
4. кашель, гипертермию в течение 3 дней

Правильный ответ: 2 - кашель и лихорадку более 2-3 недель

Вопрос 2

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гастрошизис
2. **недоношенность**
3. атрезия кишечника
4. многоводие

Правильный ответ: 2 - недоношенность

Вопрос 3

ОКРУГЛЫЕ ФОРМЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ОБЪЯСНЯЮТСЯ

1. малой двигательной активностью ребёнка
2. меньшей толщиной кожи
3. **большим удельным весом подкожной клетчатки по отношению к массе тела**
4. большим размером жировых клеток и очень низкой активностью ребёнка

Правильный ответ: 3 - большим удельным весом подкожной клетчатки по отношению к массе тела

Вопрос 4

В МЕСТЕ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ 2 ТЕ ППД-Л У ИНФИЦИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАЩЕ ФОРМИРУЕТСЯ

1. **папула**
2. гиперемия
3. участок депигментации
4. рубчик

Правильный ответ: 1 - папула

Вопрос 5

ДЕФИЦИТ МОЛОКА ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ 2 СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. 20
2. **50**
3. 75
4. 25

Правильный ответ: 2 - 50

Вопрос 6

ПЕРЕД ДОПУСКОМ РЕБЕНКА К ЗАНЯТИЯМ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

1. рентгенографии органов грудной клетки
2. спирографии
3. холтеровского мониторирования ЭКГ
4. **ЭКГ в покое и с физической нагрузкой**

Правильный ответ: 4 - ЭКГ в покое и с физической нагрузкой

Вопрос 7

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА САЛЬБУТАМОЛА ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СТАРШЕ 12 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИГРАММАХ)

1. 1
2. 1,5
3. **2,5**
4. 2

Правильный ответ: 3 - 2,5

Вопрос 8

К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМУ НАЛИЧИЕ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СТАРШЕ 5 ЛЕТ, ОТНОСИТСЯ

1. **объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) менее 80% от должных величин**
2. снижение жизненной ёмкости лёгких
3. объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) от 80 до 100% от должных величин
4. отрицательная проба с бета2-агонистом

Правильный ответ: 1 - объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) менее 80% от должных величин

Вопрос 9

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ ПАЛИВИЗУМАБА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ

1. рожденным на 37 неделе гестации или позже
2. с пороками развития желудочно-кишечного тракта
3. **рожденным на 35 неделе гестации или ранее**
4. с пороками развития нервной системы

Правильный ответ: 3 - рожденным на 35 неделе гестации или ранее

Вопрос 10

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СТОЙКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА IV СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА В ДИАПАЗОНЕ ОТ_____ ДО_____ (%)

1. **от 90 до 100**
2. от 50 до 90
3. от 70 до 80
4. от 40 до 60

Правильный ответ: 1 - от 90 до 100