



Педиатрия (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:36 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 08:01 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПОДЛЕЖАТ ДЕТИ, ОБРАТИВШИЕСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ С ЖАЛОБАМИ НА

1. субфебрилитет в течение недели, потерю массы тела, жидкий стул
- ☒ 2. кашель и лихорадку более 2-3 недель
3. боль в грудной клетке, гипертермию в течение 7 дней
4. кашель, гипертермию в течение 3 дней

Правильный ответ: 2 — кашель и лихорадку более 2-3 недель

Вопрос 2

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гастрошизис
- ☒ 2. недоношенность
3. атрезия кишечника
4. многоводие

Правильный ответ: 2 — недоношенность

Вопрос 3

ОКРУГЛЫЕ ФОРМЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ОБЪЯСНЯЮТСЯ

1. малой двигательной активностью ребёнка
2. меньшей толщиной кожи
- ☒ 3. большим удельным весом подкожной клетчатки по отношению к массе тела
4. большим размером жировых клеток и очень низкой активностью ребёнка

Правильный ответ: 3 — большим удельным весом подкожной клетчатки по отношению к массе тела

Вопрос 4

В МЕСТЕ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ 2 ТЕ ППД-Л У ИНФИЦИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАЩЕ ФОРМИРУЕТСЯ

- ☒ 1. папула
2. гиперемия
3. участок депигментации
4. рубчик

Правильный ответ: 1 — папула

Вопрос 5

ДЕФИЦИТ МОЛОКА ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ 2 СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. 20
- ☒ 2. 50
3. 75

4. 25

Правильный ответ: 2 — 50

Вопрос 6

ПЕРЕД ДОПУСКОМ РЕБЕНКА К ЗАНЯТИЯМ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

1. рентгенографии органов грудной клетки
2. спирографии
3. холтеровского мониторирования ЭКГ
4. ЭКГ в покое и с физической нагрузкой

Правильный ответ: 4 — ЭКГ в покое и с физической нагрузкой

Вопрос 7

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА САЛЬБУТАМОЛА ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СТАРШЕ 12 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИГРАММАХ)

1. 1
2. 1,5
3. 2,5
4. 2

Правильный ответ: 3 — 2,5

Вопрос 8

К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМУ НАЛИЧИЕ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СТАРШЕ 5 ЛЕТ, ОТНОСИТСЯ

1. объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) менее 80% от должных величин
2. снижение жизненной ёмкости лёгких
3. объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) от 80 до 100% от должных величин
4. отрицательная проба с бета2-агонистом

Правильный ответ: 1 — объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) менее 80% от должных величин

Вопрос 9

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ ПАЛИВИЗУМАБА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ

1. рожденным на 37 неделе гестации или позже
2. с пороками развития желудочно-кишечного тракта
3. рожденным на 35 неделе гестации или ранее
4. с пороками развития нервной системы

Правильный ответ: 3 — рожденным на 35 неделе гестации или ранее

Вопрос 10

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СТОЙКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА IV СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА В ДИАПАЗОНЕ ОТ ____ ДО ____ (%)

- 1** от 90 до 100
- 2. от 50 до 90
- 3. от 70 до 80
- 4. от 40 до 60

Правильный ответ: 1 — от 90 до 100