



Пластическая хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:13 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 04:48 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АУГМЕНТАЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНЕСТЕЗИЯ

1. местная инфильтрационная
2. проводниковая
3. общая
4. эпидуральная

Правильный ответ: 3 — общая

Вопрос 2

БЛОК ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ ДОПОЛНЯТЬ БЛОКАДОЙ

1. латерального и медиального кожных нервов предплечья
2. лучевого нерва
3. локтевого нерва
4. срединного нерва

Правильный ответ: 3 — локтевого нерва

Вопрос 3

ОСЛОЖНЕНИЕМ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН ЯВЛЯЕТСЯ

1. эвентрация внутренних органов
2. гипоксия краев раны
3. микробная контаминация через дренаж
4. дегидратация раны

Правильный ответ: 3 — микробная контаминация через дренаж

Вопрос 4

УКУШЕННЫЕ РАНЫ ОПАСНЫ РАЗВИТИЕМ БЕШЕНСТВА, СТОЛБНЯКА И

1. анаэробной инфекции
2. рожистого воспаления кожи
3. глубокого микоза
4. опоясывающего лишая

Правильный ответ: 1 — анаэробной инфекции

Вопрос 5

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ РЕДУКЦИОННОЙ ЛАБИОПЛАСТИКИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ ЯВЛЯЕТСЯ

1. разметка лоскутов
2. измерение соотношения ширины малых и больших половых губ
3. инфильтрационная анестезия
4. аппликационная анестезия

Правильный ответ: 1 — разметка лоскутов

Вопрос 6

ДВОЙНАЯ ПЕТЛЕВАЯ НИТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СШИВАНИИ СУХОЖИЛИЯ ПО МЕТОДУ

1. Tsuge
2. Kessler
3. Bunnell
4. Cuneo

Правильный ответ: 1 — Tsuge

Вопрос 7

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СИНКИНЕЗИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. содружественным движением несвойственных групп мышц
2. сочетанием гемипареза с параличом мимических мышц
3. выпадением как произвольных, так и непроизвольных движений
4. содружественным движением мимических мышц с двух сторон

Правильный ответ: 1 — содружественным движением несвойственных групп мышц

Вопрос 8

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРБИТАЛЬНОГО ГИПЕРТЕЛОРИЗМА P.TESSIER ОСНОВАНА НА ИЗМЕРЕНИИ

1. скуловой ширины (расстояния между точками zigion-zigion)
2. расстояния между серединами передних слезных гребней
3. расстояния на уровне начала верхней трети глазниц
4. межзрачкового расстояния

Правильный ответ: 2 — расстояния между серединами передних слезных гребней

Вопрос 9

ЗАДАЧАМИ ПОВЯЗКИ В ФАЗЫ ПРОЛИФЕРАЦИИ И ЭПИТЕЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, АТРАВМАТИЧНОСТЬ И

1. удаление максимального количества экссудата
2. профилактика вторичного инфицирования
3. аутолитическое очищение раны
4. возможность самостоятельной смены повязки

Правильный ответ: 2 — профилактика вторичного инфицирования

Вопрос 10

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

1. антропометрические показатели, имеющие цифровое выражение для каждой женщины
2. очертания, диктуемые предпочтениями хирурга
3. контуры, которыми довольна пациентка

4 диапазон контуров, за пределами которого неэстетичность заметна непредвзятому наблюдателю

Правильный ответ: 4 — диапазон контуров, за пределами которого неэстетичность заметна непредвзятому наблюдателю