MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Психиатрия

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:24 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ИСТЕРИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ ЛИЧНОСТИ СВОЙСТВЕННЫ

1. повышенная замкнутость и эмоциональная холодность
2. постоянно приподнятое настроение и тотальный оптимизм
3. тревожная мнительность и пессимизм
4. **психический инфантилизм, гиперэмотивность и эгоцентризм**

Правильный ответ: 4 - психический инфантилизм, гиперэмотивность и эгоцентризм

Вопрос 2

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АФФЕКТ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО, СЧИТАЮТ

1. агрессивное поведение
2. **помрачение сознания**
3. наличие галлюцинаций
4. компульсивное влечение к насилию и нанесению повреждений

Правильный ответ: 2 - помрачение сознания

Вопрос 3

СИМПТОМЫ «ФИЗИЧЕСКОЙ АНГЕДОНИИ» ПРОЯВЛЯЮТСЯ

1. **снижением или утратой позитивного восприятия стимулов, имеющих отношение к пищевому и половому влечению**
2. нарушениями потребности в сне
3. снижением или утратой удовольствия от привычной деятельности
4. астеническим синдромом с проявлениями редукции энергетического потенциала

Правильный ответ: 1 - снижением или утратой позитивного восприятия стимулов, имеющих отношение к пищевому и половому влечению

Вопрос 4

ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ПАЛИПЕРИДОН НАИМЕНЬШИЙ РИСК УХУДШЕНИЯ ПРИ БЫСТРОЙ ОТМЕНЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ

1. кветиапин
2. клозапин
3. оланзапин
4. **арипипразол**

Правильный ответ: 4 - арипипразол

Вопрос 5

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВКЛЮЧАЕТ

1. выявление при сборе анамнеза наследственности по эндокринным заболеваниям
2. анализ средовых факторов, диагностической психиатрической категории, длительности заболевания
3. **обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния**
4. оценку рецепторной предпочтительности препарата

Правильный ответ: 3 - обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния

Вопрос 6

ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ИНФАНТИЛИЗМА ХАРАКТЕРНО

1. грубое нарушение речевого развития
2. прогрессирующее течение заболевания
3. **наличие черт «детскости» в физическом и психическом облике**
4. начало заболевания после периода нормального развития

Правильный ответ: 3 - наличие черт «детскости» в физическом и психическом облике

Вопрос 7

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТОЯНСТВА СОСТАВА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МОГУТ БЫТЬ

1. смешанного типа, включающие эклектичный состав участников и методов работы
2. неструктурированными, с непостоянным составом участников и неограниченной продолжительностью
3. **открытыми, не иметь постоянного состава участников, без фиксированной длительности работы**
4. полузакрытыми, с постоянным составом участников, но без фиксированной продолжительности работы

Правильный ответ: 3 - открытыми, не иметь постоянного состава участников, без фиксированной длительности работы

Вопрос 8

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ТЕРАПИИ ДВУМЯ АНТИПСИХОТИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗИРОВКАХ В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ (В НЕДЕЛЯХ)

1. 4-6
2. **6-8**
3. 9-10
4. 2-3

Правильный ответ: 2 - 6-8

Вопрос 9

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ СВЯЗАН С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

1. NK-лимфоцитов
2. В-лимфоцитов
3. **Т-лимфоцитов**
4. Фагоцитов

Правильный ответ: 3 - Т-лимфоцитов

Вопрос 10

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РАСТОРМОЖЕННОСТЬ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ НЕПОСЕДЛИВОСТЬ, ОБЩАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1. **гиперкинетического (гипердинамического синдрома)**
2. неврозоподобного синдрома
3. психопатоподобного синдрома
4. тревожного расстройства

Правильный ответ: 1 - гиперкинетического (гипердинамического синдрома)