



Психиатрия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:22 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 04:55 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ИСТЕРИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ ЛИЧНОСТИ СВОЙСТВЕННЫ

1. повышенная замкнутость и эмоциональная холодность
2. постоянно приподнятое настроение и тотальный оптимизм
3. тревожная мнительность и пессимизм
- ④ психический инфантилизм, гиперэмотивность и эгоцентризм

Правильный ответ: 4 — психический инфантилизм, гиперэмотивность и эгоцентризм

Вопрос 2

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АФФЕКТ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО, СЧИТАЮТ

1. агрессивное поведение
- ② помрачение сознания
3. наличие галлюцинаций
4. компульсивное влечение к насилию и нанесению повреждений

Правильный ответ: 2 — помрачение сознания

Вопрос 3

СИМПТОМЫ «ФИЗИЧЕСКОЙ АНГЕДОНИИ» ПРОЯВЛЯЮТСЯ

- ① снижением или утратой позитивного восприятия стимулов, имеющих отношение к пищевому и половому влечению
2. нарушениями потребности в сне
3. снижением или утратой удовольствия от привычной деятельности
4. астеническим синдромом с проявлениями редукции энергетического потенциала

Правильный ответ: 1 — снижением или утратой позитивного восприятия стимулов, имеющих отношение к пищевому и половому влечению

Вопрос 4

ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ПАЛИПЕРИДОН НАИМЕНЬШИЙ РИСК УХУДШЕНИЯ ПРИ БЫСТРОЙ ОТМЕНЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ

1. кветиапин
2. клозапин
3. оланзапин
- ④ арипипразол

Правильный ответ: 4 — арипипразол

Вопрос 5

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВКЛЮЧАЕТ

1. выявление при сборе анамнеза наследственности по эндокринным заболеваниям
2. анализ средовых факторов, диагностической психиатрической категории, длительности заболевания

3 обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния

4. оценку рецепторной предпочтительности препарата

Правильный ответ: 3 — обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния

Вопрос 6

ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ИНФАНТИЛИЗМА ХАРАКТЕРНО

1. грубое нарушение речевого развития

2. прогрессирующее течение заболевания

3 наличие черт «детскости» в физическом и психическом облике

4. начало заболевания после периода нормального развития

Правильный ответ: 3 — наличие черт «детскости» в физическом и психическом облике

Вопрос 7

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТОЯНСТВА СОСТАВА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МОГУТ БЫТЬ

1. смешанного типа, включающие эклектичный состав участников и методов работы

2. неструктурированными, с непостоянным составом участников и неограниченной продолжительностью

3 открытыми, не иметь постоянного состава участников, без фиксированной длительности работы

4. полужакрытыми, с постоянным составом участников, но без фиксированной продолжительности работы

Правильный ответ: 3 — открытыми, не иметь постоянного состава участников, без фиксированной длительности работы

Вопрос 8

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ТЕРАПИИ ДВУМЯ АНТИПСИХОТИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗИРОВКАХ В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ (В НЕДЕЛЯХ)

1. 4-6

2 6-8

3. 9-10

4. 2-3

Правильный ответ: 2 — 6-8

Вопрос 9

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ СВЯЗАН С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

1. NK-лимфоцитов

2. В-лимфоцитов

3 Т-лимфоцитов

4. Фагоцитов

Правильный ответ: 3 — Т-лимфоцитов

Вопрос 10

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РАСТОРМОЖЕННОСТЬ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ НЕПОСЕДЛИВОСТЬ, ОБЩАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- 1. гиперкинетического (гипердинамического синдрома)
- 2. неврозоподобного синдрома
- 3. психопатоподобного синдрома
- 4. тревожного расстройства

Правильный ответ: 1 — гиперкинетического (гипердинамического синдрома)