



Сурдология-оториноларингология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 06:11 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 05:55 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОНАЛЬНОЙ ПОРОГОВОЙ АУДИОМЕТРИИ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С

1. любого уха
2. хуже слышащего уха
3. правого уха
4. лучше слышащего уха

Правильный ответ: 4 — лучше слышащего уха

Вопрос 2

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ПУТЕМ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В СРЕДНЕЕ УХО ЯВЛЯЕТСЯ

1. транстубарный
2. контактный
3. лимфогенный
4. гематогенный

Правильный ответ: 1 — транстубарный

Вопрос 3

ЧАСТОТА КУРСОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД СТАБИЛИЗАЦИИ ТУГОУХОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

1. 1-2 раза в год
2. не проводится
3. 1 раз в 3 месяца
4. 1 раз в год

Правильный ответ: 1 — 1-2 раза в год

Вопрос 4

ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЮ СЧИТАЮТ

1. нарушение функции вестибулярного аппарата
2. возраст старше 60 лет
3. симметричный слух
4. одностороннее нарушение слуха

Правильный ответ: 1 — нарушение функции вестибулярного аппарата

Вопрос 5

ПОД ТЕРМИНОМ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПОНИМАЮТ

1. разницу выходных уровней звукового давления на фиксированной частоте (500 Гц), в крайних положениях регулятора тембра
2. максимальное значение звукового давления, когда увеличение входного уровня звукового давления не приводит к дальнейшему увеличению уровня звукового давления на выходе

3. разницу выходных уровней звукового давления на фиксированной частоте (3000 Гц), в крайних положениях регулятора тембра
4. разность между выходным уровнем звукового давления (поступающего в ухо пациента) и входным уровнем звукового давления (воспринимаемым микрофоном слухового аппарата)

Правильный ответ: 2 — максимальное значение звукового давления, когда увеличение входного уровня звукового давления не приводит к дальнейшему увеличению уровня звукового давления на выходе

Вопрос 6

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УШНОЙ ШУМ, СОЧЕТАЮЩИЙСЯ СО СНИЖЕНИЕМ СЛУХА И ОЩУЩЕНИЕМ ЗАЛОЖЕННОСТИ ПОРАЖЕННОГО УХА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ДАННОГО СОСТОЯНИЯ

1. порок сердца
2. средний отит
3. патология височно-нижнечелюстного сустава
4. рассеянный склероз

Правильный ответ: 2 — средний отит

Вопрос 7

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ФЛЮКТУАЦИИ ПРИ ПЕРИХОНДРИТЕ УШНОЙ РАКОВИНЫ

1. произвести пункцию в месте флюктуации, наложить давящую повязку
2. провести УВЧ - терапию
3. произвести широкий разрез ткани, дренировать вскрытую полость турундой с гипертоническим или антисептическим раствором
4. наложить полуспиртовый компресс

Правильный ответ: 3 — произвести широкий разрез ткани, дренировать вскрытую полость турундой с гипертоническим или антисептическим раствором

Вопрос 8

ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ИЗ

1. носоглотки
2. наружного уха
3. внутреннего уха
4. полости черепа

Правильный ответ: 1 — носоглотки

Вопрос 9

К АНАТОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЯМ СРЕДНЕГО УХА ОТНОСИТСЯ

1. улитка
2. барабанная полость
3. купула
4. сигмовидный синус

Правильный ответ: 2 — барабанная полость

Вопрос 10

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОМ СИНУСИТЕ ПОКАЗАНА

- 1.** пункция верхнечелюстной пазухи
- 2. этмоидотомия
- 3. фронтотомия
- 4. сфеноидотомия

Правильный ответ: 1 — пункция верхнечелюстной пазухи