



Управление сестринской деятельностью

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 2

Вопросов: 24

Сформировано: 25.07.2026, 07:02 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 06:21 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Управление сестринской деятельностью

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская клиническая больница № 55» в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит плановую проверку деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов медицинской организации.

Медицинская сестра процедурного кабинета урологического отделения начала свой рабочий день с процедуры взятия венозной крови у пациентов. Ее рабочий халат уже был загрязнен кровью, в нем же она и продолжила работу. Помимо этого, на ее руках было замечено несколько колец и браслетов.

Укладка первой помощи профилактики парентеральных инфекций находится с открытой крышкой, в ней содержится йода раствор спиртовой 5%, марлевые салфетки, этанола раствор 70%, бактерицидный лейкопластырь. В укладке для оказания экстренной медпомощи при анафилактическом шоке находится адреналин, натрия хлорид, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, димедрол, атропин.

Во время проведения генеральной уборки медицинская сестра была расстроена тем, что дезинфицирующее средство попало на костюм, в котором она работала, и в глаза.

Кроме того, в рамках проверки были отмечены следующие факты:

- * раствор гепарина находился на полке в стеклянном шкафу;
- * не все пачки с лекарственными препаратами располагаются штрих-кодом, маркировкой и названием вверх.

1. Управление медицинской организацией

Вопрос 1.

При загрязнении халата/костюма медицинской сестры процедурного кабинета урологического отделения биологическими жидкостями

1. ничего предпринимать не надо
2. можно продолжить работу при наличии очереди у кабинета
3. необходимо сменить форменную одежду
4. медицинская сестра обязана продолжить работу, если у кастелянши не оказалось чистого халата

Правильный ответ: 3 — необходимо сменить форменную одежду

«3467. Смена спецодежды в подразделениях хирургического и акушерского профиля, отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), отделениях трансплантации, отделениях для лиц с иммунодефицитными состояниями, в процедурных и перевязочных кабинетах, осуществляется ежедневно и по мере загрязнения; в учреждениях терапевтического профиля - 2 раза в неделю и по мере загрязнения. Сменная обувь персонала должна быть из нетканого материала, доступного для дезинфекции. Внешние поверхности сменной обуви подлежат дезинфекции с той же периодичностью, что и спецодежда дезинфицирующими средствами, разрешенными для этих целей».

«при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для автоклавирувания»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (1) (2)

Вопрос 2.

Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, комплектуется следующими медицинскими изделиями и лекарственными препаратами: йода раствор спиртовой 5%, бинт, лейкопластырь бактерицидный, этанола раствор 70% и

1. борную кислоту раствор 1%
2. салфетку марлевую стерильную
3. протаргола раствор 1%
4. перманганата калия навеску 10 г

Правильный ответ: 2 — салфетку марлевую стерильную

Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь (далее - укладка), комплектуется следующими медицинскими изделиями и лекарственными препаратами»:

- * бинт марлевый медицинский стерильный (не менее 5 м × 10 см) — 2 штуки;
- * лейкопластырь бактерицидный (1,9×7,2 см) — 3 штуки;
- * салфетки медицинские стерильные (не менее 16 см × 13 см, № 10) — 2 упаковки;
- * калия йодид — раствор для наружного применения 5% — 10 мл;
- * этанол — раствор для наружного применения 70% — 100 мл.
- * хлоргексидин - раствор для наружного применения 0,5% - 100 мл.

Приказ Минздрава России от 11 апреля 2025 года № 189н Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь(1) (2)

Вопрос 3.

Противошоковый набор для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке включает в себя декстрозу, натрия хлорид, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, сальбутамол, эпинефрин, хлоропирамин, и

1. аммиак
2. инсулин
3. гепарин
4. атропин

Правильный ответ: 4 — атропин

Рекомендуемый противошоковый набор (для процедурных, стоматологических кабинетов):

- * Раствор эпинефрин 0,1 % в ампулах № 10.
- * Раствор преднизолона (30 мг) в ампулах №10 и/или раствор дексаметазона** (4 мг) в ампулах № 10 и/или раствор гидрокортизона 100 мг - № 10.
- * Дифенгидрамин 1% в ампулах №10 и/или клемастин 0,1% - 2 мл в ампулах № 10 и/или хлоропирамин 2% - 1 мл в ампулах № 10.
- * Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза № 2.

- * Раствор декстрозы 40% в ампулах № 20.
- * Раствор хлорида натрия 0,9% в ампулах № 20.
- * Раствор декстрозы 5% – 250 мл (стерильно) № 2.
- * Раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл № 2.
- * Раствор атропина 0,1% в ампулах № 5.
- * Этанол 70% – 100 мл.
- * Роторасширитель № 1.
- * Языкодержатель № 1.
- * Жгут № 1.
- * Шприцы одноразового пользования 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл и иглы к ним по 5 шт.
- * Внутривенный катетер или игла (калибром G14-18; 2,2-1,2 мм) № 5.
- * Система для внутривенных капельных инфузий № 2.
- * Перчатки медицинские одноразовые 2 пары.
- * Воздуховод.
- * Аппарат дыхательный ручной (тип AMBU).
- * Ларингеальная маска.
- * Надгортанные устройства для обеспечения проходимости дыхательных путей.

Клинические рекомендации Минздрава России. Анафилактический шок, 2025 г. (1)

Вопрос 4.

При попадании дезинфицирующих препаратов в глаза медицинской сестре урологического отделения следует

1. заложить за веко мазь гидрокортизона 5%
2. закапать в глаза капли тетризолин (визин) двукратно с перерывом в 5 минут
3. промыть их проточной водой 5 - 10 мин, закапать сульфацила натрия раствор 30%
4. промывать их дистиллированной водой в течение 20 минут

Правильный ответ: 3 — промыть их проточной водой 5 - 10 мин, закапать сульфацила натрия раствор 30%

«Цель: оказать первую медицинскую помощь при случайном попадании рабочего раствора дезинфицирующего средства «Дезоформ» в глаза» (таблица).

Дезинфекция: учеб. пособие / Осипова В. Л. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-9704-3120-7.

(1)

Вопрос 5.

Инсулин следует хранить в

1. стеклянном шкафу

2. холодильнике

3. сейфе кабинета старшей медицинской сестры

4. морозильной камере

Правильный ответ: 2 — холодильнике

Согласно Приказу Минздрава России от 29.04.2025 N 260н "Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения"

«45. Хранение термолабильных лекарственных средств осуществляется в специально оборудованных помещениях (холодильных камерах) или в помещениях для хранения, оснащенных холодильными шкафами, холодильниками, если специальные условия хранения не указаны производителем на упаковке лекарственного средства».

Приказ Минздрава России от 29.04.2025 N 260н "Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения" (1)

Запас инсулина нужно хранить в холодильнике при температуре +2...+8 °C (на дверце холодильника или в ящике для овощей). Не замораживать!

Сахарный диабет 1 типа. Что необходимо знать. Руководство для детей и их родителей / под ред. В. А. Петерковой, А. Ю. Майорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-6169-3

(1)

Вопрос 6.

Упаковки с запечатанными ампулами должны размещаться в процедурном кабинете урологического отделения

1. вместе с дезинфицирующими и антисептическими средствами

2. в свободном порядке на полках шкафа кабинета

3. этикеткой (маркировкой) наружу строго по инструкции

4. на поверхностях рабочих столиков

Правильный ответ: 3 — этикеткой (маркировкой) наружу строго по инструкции

Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в соответствии с требованиями

Государственной фармакопеи и нормативной документации, а также с учетом свойств веществ, входящих в их состав.

При хранении в шкафах, на стеллажах или полках лекарственные препараты для медицинского применения во вторичной (потребительской) упаковке должны быть размещены этикеткой (маркировкой) наружу.

Организация и управление фармацевтической деятельностью : учебное пособие / под ред. И. А. Наркевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-7175-3

(1)

Вопрос 7.

Процедурной медсестре урологического отделения во время работы носить кольца и браслеты на руках

1. запрещается нормативными документами

2. не противопоказано, если она работает в перчатках

3. разрешено при запланированном вечернем мероприятии

4. возможно, если она не успела снять кольца и браслеты

Правильный ответ: 1 — запрещается нормативными документами

«3477. Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений. Перед обработкой рук необходимо снять часы, браслеты и другие. Для высушивания рук применяют чистые тканевые полотенца или бумажные салфетки однократного использования, в санитарно-бытовых помещениях, помещениях приема пищи также допускается использовать электросушители или бесконтактные устройства для сушки рук; при обработке рук хирургов используют стерильные тканевые салфетки».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (1)

Вопрос 8.

Генеральная уборка процедурного кабинета урологического отделения проводится + ____ + раз(а) в + ____ + дней

1. 1; 14
2. 1; 30
3. 2; 10
4. 1; 7

Правильный ответ: 4 — 1; 7

«3561. Генеральные уборки в операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом проводят не реже одного раза в 7 календарных дней дезинфицирующими средствами по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (1)

Вопрос 9.

Генеральная уборка в урологическом отделении проводится в

1. специальной одежде и средствах индивидуальной защиты
2. своей обычной одежде, в которой ходят по улице
3. костюме для процедуры взятия крови
4. рабочем халате, в котором проводились манипуляции

Правильный ответ: 1 — специальной одежде и средствах индивидуальной защиты

«Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки».

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / В. Н. Сметанин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6419-9.

(1)

Вопрос 10.

При расчете потребности в дезинфицирующем средстве для очистки и обеззараживания поверхностей во время генеральной уборки урологического отделения с кратностью обработки один раз в неделю учитывают

1. фактический срок годности раствора в сутках
2. количество недель в расчетном периоде
3. объем дезинфицирующего раствора
4. количество обрабатываемого материала

Правильный ответ: 2 — количество недель в расчетном периоде

«K - коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирующего раствора по препарату, %; S - площадь обрабатываемых внутренних поверхностей, м²; Н - количество недель в расчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год), если генеральная уборка проводится еженедельно».

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / Под ред. Г. Н. Пономаренко - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. (Серия "Национальные руководства")

(1)

Вопрос 11.

Организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке в урологическом отделении

1. врач-эпидемиолог
2. заведующий лечебным подразделением
3. старшая медицинская сестра
4. главная медицинская сестра

Правильный ответ: 3 — старшая медицинская сестра

1.12. Старшая медицинская сестра отделения:

* ведет учетно-отчетную документацию получения, расходования и применения дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для ПСО и кожных антисептиков в отделении;

* организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке в отделении...

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи / В. Н. Сметанин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6419-9.

(1)

Вопрос 12.

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет + _____ + и выносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

1. справку; выработке плана развития медицинской организации
2. протокол; передаче материалов проверки в прокуратуру
3. акт; информированию средств массовой информации о выявленных нарушениях в урологическом отделении

- 4 отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру процедурного кабинета урологического отделения

Правильный ответ: 4 — отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру процедурного кабинета урологического отделения

Приказ от 31 июля 2020 г. № 785н "об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"

«20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников».

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статья 192. Дисциплинарные взыскания: «За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям».

ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (1) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 07.04.2025) (1)

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Управление сестринской деятельностью

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 99» в рамках оценки внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит проверку деятельности медицинского персонала кабинета вакцинопрофилактики для оценки качества организации иммунопрофилактики. В рамках проверки были отмечены следующие факты:

- * в холодильнике с вакцинами обнаружен термометр, лежащий на верхней полке;
- * обнаружены живые вакцины с истекшим сроком годности;
- * растворитель для восстановления лиофильно высушенных вакцин хранится в стеклянном шкафу.

Кроме того, медицинской сестре было поручено транспортировать вакцины в другой филиал, для чего она упаковала ампулы с вакцинами в бумажный конверт.

Проверка документации кабинета показала, что генеральная уборка холодильника проводится один раз в две недели.

Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики заранее набрала несколько шприцев с вакциной и поместила их на стерильном столике, так как к ней на прием были записаны несколько детей подряд по времени.

Медицинская сестра предложила нескольким пациентам одного пола и их сопровождающим пройти в кабинет для проведения процедуры.

1. Управление медицинской организацией

Вопрос 1.

Растворитель для вакцин должен храниться в

1. сейфе кабинета иммунопрофилактики
2. кабинете у старшей сестры отделения
3. стеклянном шкафу кабинета иммунопрофилактики
4. холодильнике, вместе с соответствующей вакциной

Правильный ответ: 4 — холодильнике, вместе с соответствующей вакциной

«Растворитель при восстановлении лиофильно высушенных вакцин должен иметь температуру в пределах от 2 до 8°C, что обеспечивается хранением растворителя вместе с вакциной в холодильнике прививочного кабинета. Восстановленные вакцины необходимо защищать от воздействия света путем размещения флаконов с вакциной в специальных гнездах в крышке сумки-холодильника или использования специальных футляров из светонепроницаемой бумаги»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил.

(1)

Вопрос 2.

Термометр(ы) в холодильнике для хранения вакцин в количестве ____ размещают на

1. 3; верхней и нижней полке и в дверце холодильника
2. 1; верхней полке
3. 1; нижней полке

④ 2; верхней и нижней полках

Правильный ответ: 4 — 2; верхней и нижней полках

«п. 6.4.1 холодильник для хранения вакцин с маркированными полками с двумя термометрами»

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению : учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

Вопрос 3.

Вместе с вакцинами в холодильнике хранится

1. антибактериальный препарат
- ② растворитель для разведения вакцин
3. сосудосуживающий препарат
4. физиологический раствор

Правильный ответ: 2 — растворитель для разведения вакцин

«Растворитель при восстановлении лиофильно высушенных вакцин должен иметь температуру в пределах от 2 до 8°C, что обеспечивается хранением растворителя вместе с вакциной в холодильнике прививочного кабинета. Восстановленные вакцины необходимо защищать от воздействия света путем размещения флаконов с вакциной в специальных гнездах в крышке сумки-холодильника или использования специальных футляров из светонепроницаемой бумаги»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил.

(1)

Вопрос 4.

Транспортировать вакцины по улице в другой корпус необходимо в

1. твердом контейнере
- ② термоконтейнере
3. картонной коробке
4. бумажном конверте

Правильный ответ: 2 — термоконтейнере

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4267. Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом ИЛП упаковываются в специальные термоконтейнеры, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение всего времени транспортирования с учетом сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне.»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 5.

Генеральная уборка холодильника для вакцин проводится один раз в

1. неделю
2. месяц
3. три месяца
4. 15 дней

Правильный ответ: 2 — месяц

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4310. Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 6.

Перед проведением прививки медицинская сестра-вакцинатор должна проверить

1. наличие заключения врача о допуске к прививке
2. артериальное давление у пациента
3. наличие сменной обуви у пациента
4. номер пациента в очереди

Правильный ответ: 1 — наличие заключения врача о допуске к прививке

«Перед проведением прививки вакцинатор: проверяет наличие заключения врача о допуске к прививке; сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача, проверяет маркировку, срок годности медицинских иммунобиологических препаратов, целостность ампулы; визуально оценивает качество препарата (путем встряхивания сорбированных вакцин и после растворения лиофилизированных вакцин).»

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению: учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

Вопрос 7.

Максимальный срок хранения медицинских иммунобиологических препаратов в медицинских организациях, где проводятся профилактические прививки, составляет

1. 10 дней
2. 1 неделю
3. 1 месяц
4. 3 месяца

Правильный ответ: 3 — 1 месяц

«Максимальный срок хранения вакцин в учреждениях, где проводят профилактические прививки, составляет 1 мес. В труднодоступных районах данный срок хранения может быть увеличен до 3 мес.»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил.

(1)

Вопрос 8.

Вакцина из многодозных флаконов используется в течение

1. 15 минут
2. трех часов
3. недели
4. рабочего дня

Правильный ответ: 4 — рабочего дня

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4223. Вакцина из многодозных флаконов может использоваться в течение рабочего дня в соответствии с инструкцией по ее применению при соблюдении следующих условий: забор каждой дозы вакцины из флакона осуществляется с соблюдением правил асептики; вакцины хранятся при соответствующей температуре (от +2°C до +8°C); восстановленные вакцины используются немедленно и хранению не подлежат»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 9.

Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня

1. оставляют на манипуляционном столике
2. уничтожают в соответствии с установленными требованиями
3. ставят в стеклянный шкаф
4. помещают в холодильник для дальнейшего использования

Правильный ответ: 2 — уничтожают в соответствии с установленными требованиями

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4224. Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня уничтожают в соответствии с обязательными требованиями»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 10.

Заблаговременный набор вакцины в шприцы и последующее хранение вакцины в шприцах

1. допускается для рационализации деятельности
2. не допускается категорически
3. возможен при наличии большого количества пациентов
4. разрешен во время карантина

Правильный ответ: 2 — не допускается категорически

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4227. Не разрешается заблаговременный набор вакцины в шприцы и последующее хранение вакцины в шприцах»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 11.

Одновременно в прививочном кабинете может/могут находиться ____ ребенок(а) и его(их) сопровождающий(ие)

- 1. 1
- 2. 4
- 3. 2
- 4. 3

Правильный ответ: 1 — 1

«Необходимо организовать поток пациентов таким образом, чтобы одновременно в прививочном кабинете находился только один пациент, а при проведении прививок маленьким детям — один ребенок и один его сопровождающий»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергеев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил.

(1)

Вопрос 12.

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала кабинетов иммунопрофилактики в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет ____ и вносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

- 1. отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета иммунопрофилактики
- 2. акт; информированию средств массовой информации о выявленных нарушениях
- 3. справку; выработке плана развития медицинской организации
- 4. протокол; передаче материалов проверки в прокуратуру

Правильный ответ: 1 — отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета иммунопрофилактики

«20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников».

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статья 192. Дисциплинарные взыскания:

«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям».

ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (1) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) (1)