



Анестезиология и реаниматология

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:36 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 08:28 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПОСЛЕ ПРЕМЕДИКАЦИИ ПРИ

1. введении анальгетиков
2. печеночной недостаточности
3. надпочечниковой недостаточности
4. резком изменении положения пациента

Правильный ответ: 4 — резком изменении положения пациента

Вопрос 2

ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ ПРЕМЕДИКАЦИИ

1. нарушение проходимости дыхательных путей вследствие бронхоспазма
2. продленное апноэ
3. развитие ателектаза
4. гиповентиляция и гипоксия с гиперкапнией вследствие центрального угнетения дыхания

Правильный ответ: 4 — гиповентиляция и гипоксия с гиперкапнией вследствие центрального угнетения дыхания

Вопрос 3

НАИБОЛЬШЕЙ АНАЛГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

1. пропофол
2. сомбревин
3. кетамин
4. гексенал

Правильный ответ: 3 — кетамин

Вопрос 4

В ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОСЛЕ ИНТУБАЦИОННОГО НАРКОЗА МЕДСЕСТРА ВКЛЮЧИТ

1. санацию верхних дыхательных путей
2. кормление через зонд
3. обильное питье
4. сифонную клизму

Правильный ответ: 1 — санацию верхних дыхательных путей

Вопрос 5

У ПАЦИЕНТА ПЕРВАЯ ГРУППА КРОВИ, ЕСЛИ (ПРИ ПОМОЩИ СТАНДАРТНЫХ СЫВОРОТОК ЦОЛИПК)

1. агглютинация с обеими сыворотками
2. агглютинация наступила с сыворотками II группы и нет с сывороткой III группы
3. агглютинация наступила с сывороткой III группы и нет с сывороткой II группы
4. агглютинации не наступило ни с одной из стандартных сывороток

Правильный ответ: 4 — агглютинации не наступило ни с одной из стандартных сывороток

Вопрос 6

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ____ ЧАСОВ

- ☒ 1. 24
- 2. 36
- 3. 48
- 4. 56

Правильный ответ: 1 — 24

Вопрос 7

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕКУРАРИЗАЦИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

- 1. при полной блокаде нервно-мышечной проводимости
- 2. через 20 минут при отсутствии спонтанной вентиляции
- 3. сразу же по окончании наркоза независимо от степени восстановления спонтанного дыхания
- ☒ 4. при неполном восстановлении нервно-мышечной проводимости и появлении самостоятельного дыхания

Правильный ответ: 4 — при неполном восстановлении нервно-мышечной проводимости и появлении самостоятельного дыхания

Вопрос 8

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ

- 1. Короткова
- 2. Илизарова
- ☒ 3. Вальдмана
- 4. Джарвика

Правильный ответ: 3 — Вальдмана

Вопрос 9

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛАЯ ТРАНСФУЗИОННАЯ РЕАКЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1. острой почечной недостаточности
- ☒ 2. переливании крови иной группы
- 3. нарушении свёртывающей системы крови больного
- 4. переливании крови сроком хранения 21 день

Правильный ответ: 2 — переливании крови иной группы

Вопрос 10

КИСЛОРОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ, УВЛАЖНЯЮТ

- 1. водой, подогретой до 60°C

- 2. 70% спиртом
- 3. 30% спиртом
- 4. 40% раствором глюкозы

Правильный ответ: 3 — 30% спиртом